



Copla Group
Professional Pest Control

RACUMIN POLVO



Indicaciones:

Racumin Polvo actúa como anticoagulante de la sangre y produce hemorragias internas progresivas hasta causar la muerte a ratas y ratones.

La muerte se produce de 3 a 6 días después de la ingestión del producto.

Racumin Polvo debe ser ingerido por los roedores durante 3 a 5 días.

Racumin Polvo no tiene OLOR ni SABOR.

Por estas propiedades y su alta concentración es ideal en la elaboración de cebos.

Racumin Polvo es ideal para utilizar en sitios donde se requiere de preparaciones especiales o variar la composición del cebo utilizando, para aumentar su aceptación y efectividad.

Preparación de Cebos:

Para preparar cebos se puede emplear Racumin Polvo que se mezclará con productos que consumen los roedores en proporción de 1:19. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones en la preparación de cebos:



Copla Group
Professional Pest Control

1. Buen estado de la material prima a utilizar en la preparación.
2. Triturar los granos o cereales utilizados en una forma que permitan el mezclado homogénero del cebo.
3. El equipo utilizado en la preaparación y mezcla de los cebos no debe tener olores que lo contaminen, o lo afecten, reduciendo su aceptación por los roedores.
4. Evitar el manejo directo con la manos del mezclado y del preparado final ya que las ratas olfatean el olor del humano.
5. No almacenar el cebo preparado junto con insecticidas u otros similares que puedan darle malos olores.
6. Preparar la cantidad necesaria para una aplicación no almacenar los cebos por tiempo prolongado. Los cebos frescos en buen estado tienen mayor aceptación por los roedores.
7. La mezcla debe hacerse lo mas homogénea posible. Se sugieren las siguientes sustancias para elaborar el cebo:

Carnes, tocino, pescado, harina de maíz y sorgo, arroz, avena descascarada o machacada, alimento para aves, tomate, banano, plátano maduro.

A continuación tres ejemplos de cebo a base de Racumin Polvo:

Cantidad	Cebo a utilizar
600 g	Harina de maíz amarillo
250 g	Avena machacada
50 g	Azúcar
50 g	Aceite de maíz
50 g	RACUMIN® polvo
500 g	Maíz amarillo
400 g	Harina de trigo
50 g	Azúcar
50 g	RACUMIN® polvo
900 g	Alimento para aves
50 g	Azúcar
50 g	RACUMIN® polvo

Las anteriores mezclas dan un total de 1kg de cebo. Para preparar mayores cantidades se deben tener en cuenta las mismas proporciones de los elementos en el preparado. En los cebos que se quiere adicionar aceite puede utilizarse también el de coco, palma o maní; en los cebos donde se utilicen las frutas como alimento, a un banano o plátano pequeño se coloca por encima unos 5g de Racumin Polvo; es conveniente macerar un poco la fruta y colocarla con el Racumin en el comedero.

El Racumin Polvo se puede esparcir sobre superficies que frecuentan los roedores como entrada a las guaridas, sendas de tránsito, o aplicado con una máquina de espolvoreo directamente a la madriguera. El polvo se adhiere a las patas y cuerpo del animal, lo que asegura la intoxicación por vía digestiva, debido a que el roedor tiene la costumbre de lamersse. La capa de Racumin Polvo debe revisarse y renovarse en caso necesario



Copla Group
Professional Pest Control

Antídoto:

En caso de intoxicaciones, llame o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de la etiqueta.

Tratamiento VITAMINA K1

Precauciones:

Evitar que el Racumin Polvo sea ingerido por personas o animales domésticos.

No aplicar sobre forrajes o alimentos.

Después de manipular el producto, lavarse bien las manos con agua y jabón.

